

Российские вакцины против коронавируса



Спутник V
(«Гам-КОВИД-Вак»)

НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи

«ЭпивакКорона»

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Вакцина НИИ им. М.П. Чумакова

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН

Профилактическая*

На основе аденоизиуса и гена белка SARS-CoV-2. Вирус доставляет в клетку генетический материал, но не может размножаться и вызвать заболевание. После введения организму начинает вырабатывать антитела

Профилактическая*

На основе пептидов — фрагментов белка S SARS-CoV-2. Пептиды закреплены на белке-носителе, который вместе с гидроксидом алюминия помогает усилить иммунный ответ. После введения в организм стимулирует выработку антител.

Профилактическая*

На основе инактивированного вируса. Вместе с ним и вспомогательным веществом, гидроксидом алюминия, в организме запускается иммунный ответ

Двукратно, с интервалом в 3 недели

Двукратно, с интервалом в 2–3 недели

Двукратно, с интервалом в 2 недели

Формируется через 21 день после второй вакцинации

Формируется через 30 дней после второй вакцинации

Формируется на 14 день после второй вакцинации

На данный момент иммунитет подтвержден на интервале 5–7 месяцев. Прогнозный иммунитет: как минимум на год, но точные данные покажут дальнейшие наблюдения за привитыми и переболевшими

Возможные побочные явления

- Кратковременное повышение температуры
- Головная боль

- Слабость
- Боль в мышцах и суставах
- Заложенность носа

- Першение в горле
- Сыль
- Аллергические реакции

* Не лечит, а защищает от заболевания


© АНО «Национальные приоритеты», 2020. Источник: stopkoronavirus.ru

Как проходит вакцинация от COVID-19




Перед прививкой

- Осмотр врача с измерением температуры
- Сбор сведений о контактах с инфицированными
- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр зева
- Информирование о возможных реакциях
- Заполнение информированного добровольного согласия



1 этап вакцинации

Введение компонента I
внутримышечно



2 этап вакцинации

Введение компонента II
внутримышечно
через 21 день после первой
прививки



После прививки продолжайте носить маски. Это особенно важно в течение 42 дней
после первой инъекции, пока формируется иммунитет

После прививки в течение 3-4 недель рекомендуется:



Не посещать
сауну/баню



Избегать чрезмерных
физических нагрузок



Не принимать
алкоголь



При повышении температуры можно
принять нестероидные
противовоспалительные препараты



При покраснении, отечности,
болезненности места вакцинации можно
принять антигистаминные средства

Запишитесь на вакцинацию через Госуслуги

<https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination>